

PENOÏDIUM

FONGICIDE ANTI-OÏDIUM

Autorisation de mise sur le marché (AAM) n° 2190717

Formulation EC - 100 g/l penconazole
Concentré émulsionnable (EC)


**ANTI OÏDIUM sur VIGNES,
CONCOMBRES, MELONS,
PÊCHERS et POMMIERS.**



DESCRIPTION: Penoïdium est un fongicide systémique contre l'oïdium pour la vigne, les arbres fruitiers, les cultures légumières, contenant du penconazole (famille chimique des triazoles). Il agit de manière préventive et curative par voie foliaire et systémique en inhibant la biosynthèse de l'ergostérol.

AVANTAGES

- ✓ Est un fongicide anti-moisissure systémique à base de penconazole avec une action préventive et curative sur l'oïdium de la vigne, de la pêche et du melon.
- ✓ Après application, agit par absorption foliaire entre 30 à 60 minutes.
- ✓ Penoïdium a une action anti-sporulante, restant biologiquement active pendant 12 à 14 jours, durant laquelle il favorise une protection efficace des feuilles et des grappes.



COMPOSITION

• **Penconazole** **100 g/L**

EMBALLAGES

- Carton 1 L x 12 – palette 600 L
- Carton 5 L x 4 – palette 800 L

DOSES RECOMMANDÉES

Culture	Cibles	Dose maximum d'emploi	Nombre maximum d'applications	Intervalle minimum entre les applications	Stade d'application/ conditions d'emploi	Délai avant récolte (DAR)	ZNT** aquatique
Concombre (concombre, cornichon et courgette) <i>(également autorisé sous abri)</i>	Oïdium(s)	0,5 L/ha	2/an	10 jours	Entre les stades BBCH 51 et BBCH 89	3 jours	5m
Melon (Melon, pastèque, potiron et potimarron) <i>(également autorisé sous abri)</i>	Oïdium(s)	0,5 L/ha	2/an	10 jours	Entre les stades BBCH 51 et BBCH 89	3 jours	5m
Pêcher (Uniquement sur pêcher et nectarinier)	Oïdium(s)	0,035 L/hL*	1/an ou 2 applications 1 an sur 2	10 jours	Entre les stades BBCH 71 et BBCH 89	14 jours	5m
Pommier (Pommier, cognassier, poirier, pommette, néflier, nashi)	Oïdium(s)	0,25 L/ha	2/an	10 jours	Entre les stades BBCH 71 et BBCH 89	14 jours	5m
Vigne (raisin de cuve et raisin de table)	Oïdium(s)	0,25 L/ha	2/an	Applications non consécutives	Entre les stades BBCH 53 et BBCH 79	28 jours	5m

* Volume maximum de 1500 L/ha, ne pas dépasser la dose de 0,5 L/ha

** Zone non traitée (voir phrase SPe 3)

Limites maximales de résidus : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union Européenne, consultables à l'adresse: [http:// ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database](http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database)

AFEPASA ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant son utilisation aux autres usages prévus par le catalogue des usages en vigueur.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

• **Conditions d'application**

PENOÏDIUM s'utilise en traitement préventif dès l'apparition des risques (Observations, Bulletins de Santé Végétale).

Le volume de bouillie doit être adapté au volume de végétation à protéger. Il sera spécifique à la culture et au type de pulvérisateur utilisé, consulter votre technicien.

Vigne

Utiliser PENOÏDIUM en préventif dans le cadre d'un programme adapté de lutte anti-oïdium dès le stade « grappes visibles » et dans la limite de 2 applications non consécutives par saison. Renouveler l'application au maximum 14 jours après le traitement (10 jours en cas de forte pression) .

PENOÏDIUM peut s'utiliser sur tous les types de cépages. PENOÏDIUM est sans incidence sur les fermentations et sur les qualités organoleptiques des vins et des eaux-de-vie.

Traiter sur la zone fructifère, rang par rang et face par face.

Pêcher, nectarinier

PENOÏDIUM s'applique dans le cadre d'un programme adapté à partir du stade nouaison.

Pommier, poirier, cognassier, pommette, nashi et néflier

PENOÏDIUM s'applique dans le cadre d'un programme adapté à partir du stade nouaison.

Ne pas utiliser les sous-produits de pommes traitées en alimentation animale.

Cucurbitacées à peau comestible et à peau non comestible

Utiliser PENOÏDIUM en préventif dans le cadre d'un programme adapté de lutte anti-oïdium dès l'apparition des inflorescences. Renouveler l'application au maximum 14 jours après le traitement en prenant en compte la pression de la maladie ou les avertissements agricoles, consulter votre technicien. PENOÏDIUM peut être utilisé sur des cultures de plein champ ou sous abri.



PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable : Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

