FITOSANITARIO

# AZUMO MG

80 % AZUFRE (S)
FUNGICIDA - ACARICIDA

**WG**

PRODUCTO
NO ADR

**DESCRIPCIÓN:** Azufre formulado en forma de gránulos dispersables en agua, indicado como tratamiento fungicida y acaricida para aplicación sólo o en combinación con más productos en agua.

## VENTAJAS

- Efecto preventivo y curativo contra oídio y ácaros.
- Excelente mojabilidad y dispersión en agua.
- Mayor cobertura de la superfície vegetal.
- Alta compatibilidad en mezclas con otros productos fitosanitarios.
- No genera resistencias.

## ¿POR QUÉ ME CONVIENE USARLO?

- AZUMO MG presenta una formulación exclusiva que lo dota de unas altas prestaciones para su almacenamiento y una capacidad de soportar elevadas concentraciones en agua, tanto sólo como en combinación con otros productos fitosanitarios.
- El reducido tamaño de partícula del azufre favorece un alto cubrimiento de la parte vegetal, aportando una mayor prevención de incidencia de oídio; el formulado presenta una excelente mojabilidad y dispersabilidad en agua.

## ENVASES

- **50 g / 500 g / 5kg / 10kg / 25 kg**

## MODO DE EMPLEO

**1.** Utilizar aplicado en pulverización foliar en agua, tomando las precauciones adecuadas para prevenir riesgos a las personas y al medioambiente.

**2.** Compatible con la gran mayoría de los productos fitosanitarios del mercado, en caso de duda realizar un prueba a pequeña escala.

**3.** Evitar el tratamiento con aceites 21 días antes y 21 días después de la aplicación del producto.

**4.** No aplicar foliarmente con temperaturas superiores a 30º C.

## COMPOSICIÓN

| | |
|---|---|
| • **Azufre** | **80%** |

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGRICULTURA BIODINÁMICA

AFEPASA
PALLARÈS SULPHUR
SINCE 1893

**www.afepasa.com**

| Uso | Agente | Dosis % (kg/ha) | N. aplic. | Intervalo (días) | Vol. Caldo (L/ha) | Forma y época de aplicación (cond. Especifico) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbustos ornamentales (aire libre e invernadero)** | -Oidio -Araña roja | 0,2-0,4 (1-4 kg/ha) | Max. 5 | 7-10 | 500-1000 | Aplicar en cualquier estadio de desarrollo de la planta |
| **Berenjena, pimiento, tomate (aire libre e invernadero)** | -Ácaros -Araña roja -Oidio del tomate -Oidiopsis | 0.2 (0.8 – 2 kg/ha) | Max. 6 | Min. 10 | 400-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Sandía (aire libre e invernadero)** | -Ácaros -Araña roja -Oidio de las curcubitáceas -Oidio, *Golovinomyces spp.* -Oidiopsis | 0.2 (0.8 – 2 kg/ha) | Max. 6 | Min. 10 | 400-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Melón (aire libre e invernadero)** | -Ácaros, -Araña roja -Oidio, *Podospaera, spp* -Oidio, *Golovinomyces spp.* -Oidiopsis | 0.2 (0.8 – 2 kg/ha) | Max. 6 | Min. 10 | 400-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Fresal (aire libre e invernadero)** | -Oidio de la fresa | 0.2-.4 (1-4 kg/ha) | Máx.6 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Frutales de hueso (melocotón, nectarina, cerezo y ciruelo)** | - Araña roja - Ácaros eriofidos - Oidio, *Podosphaera spp.* | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Frutales de pepita (manzano, peral, níspero, membrillero)** | -Araña roja -Ácaros eriofidos -Oidio, *Podosphaera spp.* | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Limonero** | -Ácaro de las maravillas | 0.2-0.25 (3-5 kg/ha) | Max. 6 | Min. 10 | 1500-2000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Olivo** | -Negrilla | 0.2-0.4 (1.6-4 kg/ha) | 1 | - | 800-1000 | Aplicar en primavera, desde que las brotes alcanzan el 10% de su tamaño final hasta la apertura de las primeras flores (BBCH 31-60) |
| **Rosal (aire libre e invernadero)** | -Oidio | 0.2-0.4 (1-4 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Vid** | - Araña roja - Erinosis de la vid - Oidio de la vid | 0.2-0.4 (1-4 kg/ha) | Max. 8 | 7-10 | 500-1000 | Aplicar desde 5-8 hojas desplegadas (BBCH 15-18) |

| Usos menores autorizados | Agente | Dosis % (kg/ha) | N. aplic. | Intervalo (días) | Vol. Caldo (L/ha) | Forma y época de aplicación (cond. Especifico) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acerolo, saúcos** | -Oidio | 0,2-0,5 (1-4 kg/ha) | Max. 3 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Arándano (excl.. arándano común y arándano rojo y mirtilo)** | -Oidio, *Microsphaera penicillata* | 0,2-0,5 (1-4 kg/ha) | Max. 3 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Frambueso, Zarzamoras** | -Oidio de la fresa | 0,2-0,5 (1-4 kg/ha) | Max. 3 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Grosellero (incl.. grosellero espinoso)** | -Oidio del grosellero | 0,2-0,5 (1-4 kg/ha) | Max. 3 | 7-10 | 500-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad |
| **Aguacate, caqui, chirimoyo, granado, guayabo, higuera, kiwi, kimquat, lichi, palmera datilera, platanera y piña tropical** | -Araña roja -Ácaros Eriofidos -Oidio | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Máx.6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Árbol de la pasión** | -Oidio | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Papaya** | -Oidio de la papaya | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Mango** | -Oidio del mango | 0,2-0,5 (1,4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Calabaza, (aire libre)** | -Ácaros, -Araña roja -Oidiopsis | 0.2 (1-2 kg/ha) | Max. 3 | Min. 10 | 400-100 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Pepinillos, pepino (aire libre)** | -Ácaros -Araña roja -Oidiopsis -Oidio de las curcubitáceas, -Oidio, *Golovinomyces spp.* | 0.2 (1-2 kg/ha) | Max. 3 | Min. 10 | 400-100 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Plantaciones tropicales y subtropicales (excl. carambolas, chumberas, y guanábano)** | -Araña roja -Ácaros Eriofidos, -Oidio | 0,2-0,5 (1.4-5 kg/ha) | Max. 6 | 7-10 | 700-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |
| **Okra, quimbombós (aire libre)** | -Ácaros -Araña roja -Oidio del tomate, -Oidiopsis | 0.2 (0.8-2 kg/ha) | Max. 6 | Min. 10 | 400-1000 | Realizar la primera aplicación al inicio de la enfermedad. |

Para los usos menores, según el artículo 51.5 del Reglamento (CE) Nº 1107/2009, la persona que utilice el producto será la responsable de la eficacia y fitotoxicidad del producto fitosanitario. Ante la falta de ensayos biológicos realizados por el fabricante, éste no puede garantizar la eficacia ni la ausencia de riesgos fitosanitarios relacionados con la utilización de su producto en los usos menores y declina toda responsabilidad en caso de daños causados a los cultivos.

*Plazo de seguridad: No procede