

MICLOSULF COMBI

50 % SOUFRE (S) + 0,8 % MYCLOBUTANIL

WG

PRODUIT
NON ADR



AVANTAGE

- ✓ Poudre mouillable facilement dispersée dans l'eau.
- ✓ Haute compatibilité dans les mélanges avec d'autres produits phytosanitaires.
- ✓ Effet synergique entre les deux substances actives.
- ✓ Réduit les niveaux de résistance.
- ✓ Fongicide à action préventive, curative et éradiquant contre l'oïdium, les tâches et l'oidiopsis.

DESCRIPTION

Produit formulé avec du soufre et du myclobutanil sous forme de poudre mouillable, indiqué comme traitement préventif et curatif des champignons.

Le myclobutanil est un produit systémique qui empêche le développement du mycélium une fois le champignon établi dans la plante pendant la période d'incubation, ce qui empêche de nouvelles réinfections. La présence de soufre empêche l'infection par de nouvelles spores.

POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ?

L'utilisation combinée de soufre et de myclobutanil permet de réduire les doses utilisées de produits phytosanitaires fongicides en raison de la synergie des deux substances actives.



MODE D'EMPLOI

- Utilisation appliquée en poudrage, en prenant des précautions adéquate pour prévenir les risques pour les personnes et l'environnement.
- Compatible avec la grande majorité des produits phytosanitaires du marché, en cas de doute effectuer un test à petite échelle.
- Éviter le traitement avec des huiles 21 jours avant et 21 jours après l'application du produit.
- Ne pas appliquer en mode foliaire avec des températures supérieures à 30 °C.



COMPOSITION

- | | |
|----------------|--------------|
| • Soufre (S) | 80 % |
| • Myclobutanil | 0,8 % |



EMBALLAGE

- **5 Kg**



DOSAGE RECOMMANDÉ

CULTURE / ESPÈCE	PLAIE	DOSE	TERME DE SÉCURITÉ (jours)
Cucurbitacées	Oïdium	200 - 350 g/hL	14 jours
	Pourriture noire	250 - 300 g/hL	10 - 14 jours
Raisins (vin et table)	Oïdium	400 g/hL	8 - 10 jours

