

## NUESTRA SOLUCIÓN

CECA SYSTEM, atrayente seco específico, junto a una trampa tratada con *lambda*-cihalotrina.

- Atrayente específico para hembras de **Ceratitis capitata**.
- Mosquero con una alta capacidad de captura.
- Fácil y rápida instalación.
- Eficacia probada en captura masiva para reducir y controlar las poblaciones.
- Duración por encima de **120 días**: un único difusor por trampa y campaña.
- Residuo cero. **Apto para agricultura ecológica**.
- Sin mantenimiento.

**AFEPASA**  
PALLARÈS SULPHUR  
SINCE 1893

Azufrera y Fertilizantes Pallarès, S.A.U. (AFEPASA)  
Av. Europa, 1-7, Polígono Industrial de Constantí  
43120 Constantí, Tarragona (ESPAÑA)

Tel. +34 977 524 650 · Fax. +34 977 524 651

afepasa@afepasa.com

[www.afepasa.com](http://www.afepasa.com)



INNOVANDO PARA  
UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Fabricado por:



**AFEPASA**  
PALLARÈS SULPHUR  
SINCE 1893



SISTEMA DE CAPTURA  
MASIVA

**CECA SYSTEM**

CONTROL DE  
LA MOSCA MEDITERRÁNEA  
DE LA FRUTA  
*Ceratitis capitata*

- + Atrayente seco
- + Trampa
- + Insecticida



## LA PLAGA

### *Ceratitis capitata*

*insecta, diptera, tephritidae*

- Es conocida como Mosca Mediterránea de la fruta.
- Afecta: cítricos, melocotones, nectarinas, ciruelas, higos, y otras frutas cultivadas.
- Síntomas: picadas durante la puesta y galerías en el fruto originadas por la larva,
- El número de generaciones es variable dependiendo de las condiciones de temperatura. Puede tener 7-8 generaciones/año
- Los daños más importantes los causan las larvas en los frutos de manera directa, y de manera indirecta, ya que las heridas causadas son un punto de entrada de hongos y bacterias.






El control de *Ceratitis capitata* mediante la técnica de **captura masiva** es una herramienta muy eficaz para mantener las poblaciones por debajo del umbral de daño aceptable.



Ciclo de vida de *Ceratitis capitata* : adulto, huevo, larva y pupa, que puede estar bien en el fruto o bien en el suelo.

## TRAMPAS CON ATRAYENTE: CECA SYSTEM

### ¿CÓMO LO HACEMOS?



### ¿CUÁNDO UTILIZAR?

Instalar unos **45 días** antes de la maduración del fruto, en función del tipo de cultivo que se vaya a proteger.

Reemplazar cada campaña en la misma época.

